



Bilan et Gestes Secouristes

MHC si possible : objectif sat > 95 %, glycémie, température ± PLS

Bilan



Déshabiller-
Inspecter la peau +++++
Paracétamol (15mg/kg) per os ou IR
Si indisponible => linge mouillé



Avis régulateur

Diazépam (Valium®)
0,5 mg/kg
Intra-rectal
Max 1 ampoule



PLS + O₂
LVAS

Diazépam (Valium®) 0,5 mg/kg
Intra-rectal
+/- VVP



Convulsions fébrile de l'enfant

Inclusion :

- Convulsions en cours
 - durant depuis au moins 5 minutes
 - ou succession de crises sans reprise de conscience et fièvre \geq ou = 38,5

Non Inclusion :

- Traumatisme ayant précédé la crise
- Crise terminée mais convulsion décrite par les témoins
- Découverte d'une hypoglycémie lors de la recherche de la glycémie capillaire

Contre - Indications :

- Allergie connue à un des produits utilisés

Gestes de Secourisme :

- LVAS- Si possible MHC O2 => sat $>$ 94 %
- Protection contre les traumatismes
- Mise en PLS à la fin des convulsions
- Si température \geq 38,5°C : déshabiller
- Prévoir aspi de mucosités

Modalités Pratiques :

- **Diazépam (Valium®) 10 mg/2ml:**
 - Posologie 0,5 mg/kg sans dépasser 10 mg (=1 ampoule)
 - Injection intra-rectale
 - Utiliser kit convulsions
- **Paracetamol**
si disponible per os (en l'absence de convulsions) ou intra rectal => posologie 15 mg/kg

IMPORTANT

- Rechercher dernière prise paracétamol
- Recherche taches violacées sur le corps qui ne s'effacent pas à la vitropression(purpura fulminans?)

Paramètres de surveillance :

FR +++, température, état de conscience et glasgow -
Absence ou reprise des convulsions, heure de début des convulsions
Rassurer l'enfant au réveil



Convulsions fébrile de l'enfant

Valium® (Diazépam) (10mg/2ml):

1/ Posologie: 0,5 mg/kg sans dépasser 10mg (= 1 ampoule)

Quantité à administrer en ml = poids en kg / 10

Poids après 1 an = $8+2 \times (\text{âge en années})$

Ex : un enfant de 23 mois – poids estimé à $(8+2 \times 2 = 12)$

Dose de valium à injecter pour 12 kg = 1,2 ml

Poids en kg	5	10	12	14	16	18	20
Dose en mg	2,5	5	6	7	8	9	10
Dose en ml	0,5	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2

2/ Matériel :

- 1 ampoules de diazépam
- 1 canule rectale
- 1 seringue de 10ml ou de 5ml (de préférence)
- compresses

3/ Préparation :

- casser l'ampoule
- prélever la quantité indiquée ou la totalité du produit puis ajuster à la quantité désirée
- prendre de l'air jusqu'au chiffre 5
- ajuster la canule rectale sur la seringue
- introduire la canule dans l'anus -piston vers le haut
- pousser jusqu'au bout du piston
- **attendre 1 minute avant de retirer la canule**

